Пневмококковая инфекция

вызывается бактерией S.pneumoniae

проявляется такими заболеваниями, как: **менингит, заражение крови (сепсис), пневмония, отит**

Менингиты,

вызванные пневмококком, имеют крайне тяжелое течение, высокий уровень инвалидности и смертности (среди детей погибает 1 из 4 заболевших, остаются инвалидами 6 из 10 переболевших)



Острые средние отиты

До 53-55% всех острых средних отитов у детей обусловлены пневмококковой инфекцией

Пневмококковые отиты наиболее часто подвержены осложнениям, например перфорации барабанной перепонки, приводящей к снижению слуха, вплоть до полной его потери

Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также при контакте с предметами, которые соприкасались со слюной, игрушки, предметы домашнего обихода

Опасность заболеть существует круглогодично

Вакцинация -

безопасный и эффективный способ защитить своего ребенка от пневмококковой инфекции

Источником может быть не только больной пневмококковой инфекцией, но и здоровый бактерионоситель

Пневмонии

около 500 тыс человек в России ежегодно заболевают пневмонией – это соответствует населению крупного города. Из них около 58 тыс – дети до 2 лет

Более половины пневмоний у детей первых лет жизни вызываются пневмококком

Пневмококковые пневмонии вызывают такие грозные осложнения, как сепсис, эмпиема легких (скопление гноя в плевральной полости)

Устойчивость к антибиотикам – актуальная проблема терапии пневмококковой инфекции



Кто имеет высокий риск заболеть пневмококковой инфекцией?

дети младше 2 лет
недоношенные дети

Взрослые старше 60 лет

Лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, сахарным диабетом, бронхиальной астмой

Дети, находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании

Пациенты с иммунодефицитными состояниями, длительно получающие иммуносупрессивную терапию

Лица, находящиеся в организованных коллективах (ясли, детские сады, воинские части, интернаты)

Пациенты, перенесшие ранее острый средний отит, менингит, пневмонию



СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ:

1. Все новорожденные: двукратно в 2 мес и 4,5 мес, ревакцинация в 15 мес

2. Ранее не привитые дети 3-11 месяцев:
2-кратно (интервал 4-8 нед), ревакцинация через 4-6 мес от второй прививки

3. Ранее не привитые дети 12-24 месяцев:
2-кратно (интервал не менее 8 нед), ревакцинация не проводится

4. Дети 2-5 лет и взрослые из групп риска
однократно

